

Ueber einige Derivate
des
Dimethyl-ortho-toluidins.

Inauguraldissertation

vorgelegt

der hohen philosophischen Facultät

der Universität Basel

zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde

von

ALBERT KANN

aus Wien.



WIEN.

Druck der k. u. k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme.

1898.

Ueber einige Derivate
des
Dimethyl-ortho-toluidins.

Inauguraldissertation

vorgelegt

der hohen philosophischen Facultät


der Universität Basel

zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde

von

ALBERT KANN

aus Wien.



WIEN.

Druck der k. u. k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme.

1898.

Meinen lieben Eltern

in

kindlicher Dankbarkeit gewidmet.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Vorliegende Arbeit wurde im Laboratorium der
Chemieschule in Mülhausen im Elsass auf Ver-
anlassung und unter Leitung von Herrn Director Dr.
E. Noelting ausgeführt. Es ist mir eine angenehme
Pflicht, an dieser Stelle meinem hochgeehrten Lehrer
für seine werthvollen Rathschläge bestens zu danken.

ALBERT KANN.

Einleitung.

Die drei theoretisch möglichen Dimethyltoluidine sind sämtlich dargestellt.


Das Orthoderivat wird erhalten durch Destillation von Trimethyltoluidinhydrat (Thomsen, B. 10. 1856. Nölting, B. 11. 2279). Siedepunkt 183° .


Die Darstellung des Metaderivates erfolgt aus Meta-Toluidin und Methyljodid oder durch Destillation von Trimethyltoluidinhydrat $C_7H_7N(CH_3)_3OH$ (Nölting). Siedepunkt 215° (Wurster und Riedel, B. 12. 1797).

Das Paraderivat entsteht, neben seiner isomeren Verbindung (Ortho-Dimethyltoluidin?) beim Erhitzen von Trimethylphenyliumjodid $C_6H_5N(CH_3)_3J$ auf 220° bis 230° (Hoffmann, B. 5. 707), sowie aus Para-Toluidin und Methyljodid (Thomsen, B. 10. 1586).

Von den Derivaten des Dimethylmetatoluidins wurden mehrere von Wurster und Riedel (B. 12. 1797) dargestellt. Das Dimethylparatoluidin ist schon eingehender untersucht worden (Hepburn, Dissertation Basel), während über die Derivate des Dimethyl-o-toluidins bis jetzt sehr wenig bekannt war, nämlich bloss:


Das Dimethylbromtoluidin $CH_3C_6H_3BrN(CH_3)_2$, dasselbe entsteht durch Eintragen von 1 Molekül Brom in eine essigsaure Lösung von Dimethyl-o-toluidin, oder durch Erhitzen von 5 Theilen Brom-o-toluidin mit 10 Theilen Holzgeist und 8 Theilen Salzsäure auf 180 bis 220° (Michler und Sampaio, B. 14. 2172) (Schmelzpunkt 244° bis 245°).

Das Mononitrodimethyl-o-toluidin  bildet sich

durch Alkylieren des  und Trennen der mono- und

dimethylirten Produkte durch Essigsäureanhydrid, welches mit dem monomethylirten Derivat eine Acetylverbindung gibt (Bernthsen 25. 3133). Schmelzpunkt 47·5°.

Von den Sulfosäuren des Dimethyl-o-toluidins ist bereits eine dargestellt worden durch Erhitzen von Dimethyl-o-toluidin mit 4 Theilen Schwefelsäure auf 180° bis 210° (Michler und Sampaio, B. 14. 2168). Bei dieser Sulfirung entsteht nach

Sampaio ein Nebenprodukt von der Formel 

In nachstehender Arbeit wurde eine Menge von 50 g Dimethyl-o-toluidin sulfonirt, um dieses Nebenprodukt zu erhalten; doch bildete sich davon so wenig, dass es nicht untersucht werden konnte.

Bei dieser Art des Sulfonirens dürfte wahrscheinlich ein Gemisch von Säuren entstehen. In nachstehender Arbeit wurde die reine Metasulfosäure dargestellt durch Sulfoniren mit rauchender Schwefelsäure.

Aus dem Dimethyl-o-toluidin wurde ferner seine Nitroverbindung hergestellt. H. E. Noetting und A. Collin beobachteten eine Reihe von Thatsachen, aus denen hervorgeht, dass man beim Nitriren von Aminen in Gegenwart von viel Schwefelsäure fast ausschliesslich Metaderivate erhalten kann (B. 17. 261).

NH₂ 1

In genannter Abhandlung wird das Derivat C₆H₃CH₃ 2

NO₂ 3

beschrieben, das bei 107° schmilzt und in 10 Theilen Schwefelsäure nitriert worden war. Der 1. 2. 5. Nitrokörper gab redu-


cirt das Meta-Toluidendiamin C₆H₃ $\begin{matrix} \text{NH}_2 \\ \diagup \text{CH}_3 \\ \diagdown \text{NH}_2 \end{matrix}$ (Schmelzpunkt 98 bis

99°), welches die Farbenreactionen Toluylenblau und Chrysoidin zeigte. Bei gleicher Arbeitsweise wurde die entsprechende Nitroverbindung des Dimethyl-o-toluidins aus Dimethyl-o-toluidin erhalten. Dieselbe wurde dann reducirt und aus dem Amin die Benzoyl und die p-Toluolsulfo-Verbindungen dargestellt. Die beiden letztgenannten Verbindungen wurden dann nitrosirt und die Nitrosoderivate beider gewonnen. Hierbei wurde ähnlich verfahren, wie bei der Darstellung des Nitrosodimethylanilins (Baeyer und Caro, B. 7. 810, und Schraube, B. 8. 616), doch wurde Natriumnitrit statt Aethylnitrit verwendet. Aus dem Amin wurde ferner durch Diazotiren und nachheriges Verkokchen das Phenol erhalten, aus dem Amin wurden auch mehrere Chrysoidine und ein Triazin dargestellt. Durch die Möglichkeit der Bildung von Chrysoidinen war zugleich auch ein zweiter Beweis gegeben, dass die beiden Amidogruppen zu einander in der Metastellung stehen.

Im nachfolgenden experimentellen Theil ist bei den verschiedenen dargestellten Derivaten des Dimethyl-o-toluidins immer dort kurz auf die benützte Litteratur hingewiesen, wo dies nicht schon in der Einleitung geschehen ist.

Experimenteller Theil.

Meta-Nitrodimethyl-o-toluidin.

Das Dimethyl-o-toluidin  wurde in stark saurer


Lösung nitriert, wobei, wie in der Einleitung erörtert wurde, die Nitrogruppe in die Meta-Stellung geht zur Amidogruppe, welche im vorliegenden Falle dimethylirt ist. Hierbei wurde auf folgende Weise verfahren. 100 g Dimethyl-o-toluidin wurden in 370 g concentrirter Schwefelsäure (vom specifischen Gewichte 1·84 gelöst und in diese Lösung unter starker Eiskühlung bei der Temperatur von 0° bis 4° C. eine Mischung von 51·1 cm³ Salpetersäure (vom specifischen Gewichte 1·41) und 90 cm³ Schwefelsäure (vom specifischen Gewichte 1·84) einfließen gelassen in einem Zeitraume von etwa drei Stunden bei Benützung eines Rührwerkes. Die Reaktionsmasse wurde nach einiger Zeit in eine flache Schale auf etwa $\frac{1}{2}$ kg Eis gegossen und mit Soda und am Ende mit Natronlauge alkalisch gemacht.

Die erhaltene Nitroverbindung ist mit Wasserdampf nur wenig flüchtig und wurde deshalb mit Aether extrahirt. Man lässt zu diesem Zwecke erst so lange stehen, bis sich das obige Nitroprodukt möglichst vollkommen abgeschieden hat und aus der darunter stehenden Flüssigkeit der grösste Theil des gebildeten Natriumsulfates auskrystallisirt ist, da man sonst riskirt, dass dies im Scheidetrichter statthat.

Der Aether wurde durch Abfiltriren befreit von der ihm anhaftenden Emulsion, welche aus etwas Dinitrokörper besteht, der sich in geringen Mengen immer beim Nitriren bildet und hernach mit Chlorcalcium getrocknet und abdestillirt. Der Rückstand wurde der fractionirten Destillation im Vacuum unterworfen. Zunächst destillirt unverändertes Demethyl-o-toluidin mit etwas Mononitroprodukt bei 140° und etwa 20 bis 30 *mm* Druck. Die reine Nitroverbindung selbst ging bei 170° und etwa 20 bis 30 *mm* Druck über (bei etwas niedrigerem Druck bei 165° und bei etwas höherem Druck bei 175°). Was über dieser Temperatur destillirt, ist schon ein Gemisch von Mono- und Dinitroprodukt.


Das Metanitrodimethyl-o-toluidin ist ein orangegelbes Oel, welches in einer Kältemischung erstarrt. Um den Körper rein zu erhalten, war es nothwendig, erst bei genanntem Druck die Destillation zu beginnen und dieselbe zweimal vorzunehmen. Eine Nitrirung, vorgenommen mit der gleichen Menge Salpetersäure bei Verwendung von bloss 150 *cm*³ Schwefelsäure zur Lösung von 100 *g* Dimethyl-o-toluidin, gab eine ungleich schlechtere Ausbeute.

Bei einer Nitration bildeten sich grössere Mengen des Dinitrokörpers und blieb ein Theil des Dimethyl-o-toluidins unverändert. Dieses abnorme Verlaufen der Reaction ist vielleicht auf ein unbemerktes höheres Erwärmen während der Nitration zurückzuführen. Der Mono- und Dinitrokörper waren durch fractionirte Destillation zunächst voneinander nicht zu trennen. Doch gelang die Entfernung des Binitroderivates durch Ausfrierenlassen und rasches Absaugen des Gemisches, sowie durch Lösen desselben in der berechneten Menge Salzsäure und nachherige fractionirte Fällung mit Ammoniak. Das Metanitrodimethyl-o-toluidin hat nachstehende Formel:



Der Beweis, dass die Nitrogruppe in der Metastellung steht, wird später durch das Verhalten des durch Reduction daraus gewonnenen Diamins gegeben werden. Dass

dem Nitroderivat die Stellung 1. 2. 4. zukommt, folgt daraus, dass auch beim Nitriren des o-Toluidins unter gleichen Um-

ständen sich das Derivat  bildet (E. Nölting und

A. Collin, B. XVII. 265 u. 268).

Stickstoffbestimmung:

0.1833 g Substanz geben 26 cm³ Stickstoff bei 19° und 745 mm Druck.

15.55% N berechnet,

15.99% N gefunden.


Kohlenstoff- und Wasserstoffbestimmung 0.2951 g Substanz gaben 0.1746 g Wasser und 0.646 g Kohlensäure, das sind 0.0194 g Wasserstoff und 0.17618 g Kohlenstoff.

60% C berechnet, 59.7% C gefunden,

6.66% H „ 6.57% H „

Verhalten der Nitroverbindung gegen Säuren.

Das Meta-Nitrodimethyl-o-toluidin löst sich in concentrirteren Mineralsäuren (SO₄ H₂, HCl, NO₃ H) und heisser Essigsäure; auch bei ziemlich starkem Wasserzusatz bleiben die Salze noch

unzersetzt. Das salzsaure Salz  krystallisirt

aus verdünnter Salzsäure in gelben Nadeln, die nicht hygroskopisch sind. Zur Analyse wurde dasselbe bereitet durch Einleiten von Chlorwasserstoffsäure in eine Lösung der Nitroverbindung in Benzol. An der Luft wird das Chlorid rasch gelb. Um es rein weiss zu erhalten, wurde es zwischen Filtrirpapier abgepresst und im Exsiccator über Kali und Paraffin getrocknet. Das Chlorid zersetzt sich beim Eintragen in neutrales Wasser.

Chlorbestimmung:

0.1571 g Substanz geben 0.1066 g Ag Cl, d. h. 0.02646 g Cl.

16.84% Cl gefunden,

16.44% Cl berechnet.

Meta-Amidodimethyl-o-toluidin.

Nach einem Vorversuch wurden 70 *g* Nitroverbindung in 250 *cm*³ Salzsäure und 155 *g* Zinn unter Eiskühlung in mehreren Portionen eingetragen und der Kolben nach Beendigung der plötzlich eintretenden, ziemlich heftigen Reaction noch eine halbe Stunde auf dem Wasserbade erwärmt. Die erhaltene Base ist mit Wasserdampf ziemlich schwer flüchtig und wurde nach dem Alkalischemachen durch mehrtägiges Einleiten von Wasserdampf übergetrieben und hernach ausgeäthert. Des öfteren wurde aber die Base direct nach dem Alkalischemachen mit Aether extrahirt. Zweckmässig erwies sich hierbei die Trennung der alkalischen Flüssigkeit von dem unlöslichen Zinnoxidul. Erstere wurde mit Aether extrahirt. Letzteres wurde ebenfalls mit Aether angerührt und colirt. Der Aether wurde getrocknet und abdestillirt. Die Base wurde nun der fractionirten Destillation im Vacuum unterworfen. Das Meta-Amidodimethyl-o-toluidin geht bei 149° bis 151° und 30 bis 40 *mm* Druck oder bei 146° bis 150° und 20 bis 30 *mm* Druck über. Die Base ist frisch destillirt ein fast farbloses Oel von eigenthümlichem Geruch, welches auch in verdünnten Säuren leicht löslich ist. An der Luft sehr rasch, und beim längeren Stehen in verschlossenen Gefässen wird die Base blauschwarz und dickflüssiger.

Derselben kommt, nach dem beim Nitrokörper Gesagten,

die Constitutionsformel  zu.

Stickstoffbestimmung:

0.166 *g* Substanz geben 28 *cm*³ Stickstoff bei 20° und 744 *mm* Druck.

18.8% N gefunden,

18.66% N berechnet.

Kohlenstoff- und Wasserstoffbestimmung:

0.111 *g* Substanz geben 0.296 *g* Kohlensäure und 0.0966 *g* Wasser, das sind

72·7% C gefunden, 72% C berechnet.
9·669% H gefunden, 9·33% H berechnet.

Benzoylderivat des Meta-Amidodimethyl- o-toluidins.


In eine Lösung von 4 g Natronhydrat in etwa 100 cm³ Wasser wurden 7½ g Base eingetragen und darauf portionenweise 7 g Benzoylchlorid unter Umrühren eingegossen. Die Benzoylverbindung scheidet sich zunächst in Form eines harzigen Kuchens ab, der beim Stehenlassen zum grössten Theil krystallisch wird und durch Absaugen leicht zu trennen ist. Eine bessere Ausbeute eines auch reineren Produktes erzielt man, wenn man statt sogleich abzusaugen, die ganze Reaktionsmasse etwa 10 Minuten am Wasserbade erwärmt, wobei sich alles löst und die Benzoylverbindung beim Erkalten auskrystallisirt. Durch nachheriges, zweimaliges Umkrystallisiren aus verdünntem Alkohol erhält man das reine Produkt in Gestalt von silberglänzenden Plättchen. Schmelzpunkt 128°. Leicht löslich in concentrirter Salzsäure.

Stickstoffbestimmung:

0·0977 g Substanz geben 10 cm³ Stickstoff bei 740 mm Druck und 19°.

11·44% N gefunden,
11·024% N berechnet.

Das Produkt hat die Constitutionsformel




Para-Toluolsulfoderivat des Meta-Amidodimethyl- o-toluidins.

Das zur Darstellung dieses Produktes nöthige Para-Toluolsulfochlorid ist durch mehrfache Krystallisation aus Benzol sorgfältig zu reinigen, da sonst die Herstellung des reinen

Salzes der obgenannten Base eine ungleich umständlichere ist. Es wurden 10 g Natriumhydroxyd in Wasser gelöst, dazu 10 g Base eingegossen und 13 g reines Para-Toluolsulfoclorid hinzugegeben. Man lässt am besten vor allem erkalten, und trägt dann Salzsäure bis zur gerade schwachsauren Reaction ein.

Die Para-Toluolsulfoverbindung fällt jetzt ganz aus und wird abgesaugt. Dieselbe wird durch zwei- bis dreimaliges Umkrystallisiren aus gewöhnlichem Alkohol rein erhalten. Schmelzpunkt 121°. Schöne, kleine, weisse Krystalle, welche in Benzol, Aether, Alkohol, Natronlauge und concentrirter Salzsäure leicht

löslich sind. Der Körper hat die Formel  $\text{N}(\text{CH}_3)_2$
 $\text{NH}\text{SO}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$

Stickstoffbestimmung:

0.1064 g Substanz gaben 8.4 cm³ Stickstoff bei 18° und 738 mm Druck.

9.24% N berechnet,

8.85% N gefunden.

0.0638 g Substanz gaben 5.2 cm³ Stickstoff bei 14° und 737 mm Druck.

9.24% N berechnet,

9.29% N gefunden.

Schwefelbestimmung:


0.1356 g Substanz gaben 0.106 g Ba SO₄, das sind 0.014557 g Schwefel.


10.56% S berechnet,

10.73% S gefunden.

Nitrosoderivate.

Das Dimethyl-o-toluidin liefert durch Einwirkung von salpetriger Säure kein kernsubstituiertes Nitrosoderivat, sondern unter Abspaltung einer Methylgruppe das entsprechende Nitro-

samin  Das Dimethyl-m-amidokressol aber gibt

mit salpetriger Säure eine Nitroverbindung  N(CH₃)₂.

Aehnlich wie die Gruppe OH wirken die Gruppen NH CO C₆ H₅ und NH SO₂ C₆ H₄ CH₃, und thatsächlich erlangte das Dimethyl-o-toluidin durch Einführung dieser Gruppen die Eigenschaft, im Kern substituierte Nitrosoderivate zu geben.

Nitroverbindung des Benzoylderivates des Meta-Amidodimethyl-o-toluidin.


2.5 g Benzoylverbindung wurden in 30 cm³ Salzsäure und 10 cm³ Wasser gelöst und bei starker Eiskühlung und fortwährendem Rühren 0.72 g Natriumnitrit (96%) in 10 cm³ Wasser einfließen gelassen.

Nach etwa zweistündigem Stehen wurde die saure Lösung durch Eintragen von Eis und Natronlauge in der Kälte alkalisch gemacht. Der entstandene gelbgrüne Niederschlag

wurde abgesaugt, in Aether aufgenommen, die ätherische Lösung filtrirt und im Vacuum auskrystallisiren gelassen, da sich das Produkt an der Luft leicht bräunt. Durch Krystallisation aus Aether oder besser aus Benzol erhält man ein ziemlich reines Produkt in Form goldgelber, glänzender Nadeln.

Um den Nitrosokörper ganz rein zu erhalten, löst man ihn in Aether und setzt dann ungefähr die gleiche Menge Ligroin zu. Dann erwärmt man auf dem Wasserbade bis auf etwa 40° und lässt den grössten Theil des Aethers verdampfen.

Beim Erkalten und längerem Stehen besonders beim Kratzen mit dem Glasstab an den Wänden des Kölbchens erhält man die Nitrosoverbindung als schwach gelb gefärbte Krystalle. [Schmelzpunkt 122°. Der Körper hat die Formel



Stickstoffbestimmung:


0.0893 g Substanz geben 11.5 cm³ N bei 10° und 740 mm Druck.

15.01% N gefunden,

14.84% N berechnet.

Nitrosoverbindung des Para-Toluolsulfoderivates des Meta-Amidodimethyl-o-toluidins.

Das Chlorhydrat dieses Körpers eignet sich zur Reindarstellung besser als die freie Base. Ihm kommt die Formel



In die Lösung von 6.2 g Para-Toluolsulfoverbindung in 100 cm³ Salzsäure wurden bei 0° 1.42 g Natriumnitrit 96% in 20 cm³ Wasser eintropfen gelassen, und die Reaktionsmasse blieb hernach in der Kälte noch mehrere Stunden stehen. Das

Chlorhydrat scheidet sich dann als Krystallbrei ab, statt dasselbe zunächst durch Absaugen zu trennen, ist es besser, in die Reaktionsmasse Alkali einzutragen, bis die Flüssigkeit nur mehr schwach sauer reagirt, hierbei fällt das Chlorhydrat viel vollkommener aus und mit ausgefallenes, bei der Reaction gebildetes Kochsalz geht in Lösung. Die freie Base ist orange gefärbt, in Benzol und Aether löslich, krystallisirt aber schlecht. Das Chlorhydrat wurde bei einem ersten Versuche aus heissem Wasser, dem einige Tropfen Salzsäure zugesetzt waren, umkrystallisirt. Es bildete orangegelbe Krystalle. Bei einem zweiten Versuche wurde das Chlorhydrat zweimal aus Alkohol, dem eine Spur Salzsäure zugesetzt war, umkrystallisirt und dabei nur schwach gelb gefärbte Krystalle erhalten. Der Körper ersetzt sich ohne zu schmelzen.

Chlorbestimmung:

0.0853 g Substanz geben 0.0106 g Ag Cl, das sind 0.00797 g Chlor.


Berechnet 9.63% Cl,

gefunden 9.34% Cl.



— >*< —

Durch Einwirkung von Nitrosodimethylanilin auf alkylsubstituirte Meta-Amidophenole entstehen blaugrüne Farbstoffe von grosser Echtheit (B. 25, 657. D. P. 62367 von Leonhardt & Co.). So liefert das Dimethyl-m-amidophenol mit Nitrosoderivaten tertiärer Amine blaue, basische Farbstoffe. (B. 1893, 635. D. P. 68557 von Leonhardt & Co.) Daneben bildeten sich in vielen Fällen blaugrüne Nebenprodukte, deren Menge mit der des angewendeten Nitrosokörpers zunimmt. Zur Darstellung der Farbstoffe wurden die Componenten in molekularen Mengen in alkoholischer Lösung erwärmt und dann mit Wasser verdünnt und nach dem Abdampfen des Alkohols durch Kochsalz oder Chlorzink gefällt.

Aehnlich wie das Dimethyl-m-amidophenol




müssen sich auch Körper wie das




genannten Körper ähnlich einwirken, wie Nitrosodimethyl-m-amidophenol auf Dimethyl-m-amidophenol.

Ausgeführte Condensationen.




methylanilin wurden vollständig in Alkohol gelöst und auf dem Wasserbade durch 6 Stunden erwärmt, hernach der grösste Theil des Alkohols abgedampft und das Condensationsprodukt auskrystallisiren gelassen. Versuche das Produkt zu reinigen, misslangen. Es stellt ein grauschwarzes Pulver dar, das in heissem Wasser löslich ist. Eine Ausfärbung mit 2% dieses Farbstoffes auf tannirte Baumwolle in schwach essigsaurem Bade zeigte eine ziemlich dunkle, blauviolette Farbe.



mit 0.94 g salzsaurem Nitrosodimethylanilin condensirt. Die Farbstoffbildung geht hierbei schon in kürzerer Zeit von

Statten. Der Farbstoff ist ein grauschwarzes Pulver und leicht löslich in heissem Wasser. Eine Ausfärbung zeigte eine der vorigen ähnliche, aber etwas röthere Nuance.



phenol wurden in Alkohol gelöst und wie bei den vorhergehenden Versuchen angegeben, condensirt.

Auf tannirte Baumwolle färbt dieses Condensationsprodukt ebenfalls blauviolett, aber weniger intensiv als die beiden vorhergehenden.




Kuppelung des Meta-Amidodimethyl-o-toluidins mit Diazobenzolchlorid.

Durch die Bildung eines Chrysoidinfarbstoffes war der Beweis gegeben, dass die Amidogruppe und die substituirte Amidogruppe zu einander in der Meta-Stellung stehen, und die Nitrogruppe beim Nitriren in die Meta-Stellung zur Gruppe $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ trat.

Darstellung des Chrysoidins.

4.65 g frisch destillirtes Anilin wurde in 15 g Salzsäure (etwa 3 Moleküle) und 50 cm³ Wasser gelöst und bei 0° C. 3.6 g Natriumnitrit (96 $\frac{1}{10}$ %) in 25 cm³ Wasser gelöst, einfließen gelassen, bis sich Jodkaliumstärkepapier damit färbte. In der Kälte wurde dann eine Lösung von 7 $\frac{1}{2}$ g Meta-Amidodimethyl-o-toluidin in 9 g Salzsäure (fast 2 Moleküle) und 40 cm³ Wasser gelöst, eingegossen. Der Azokörper wurde in der Kälte mit Natriumacetat oder durch successives Eintragen von Ammoniak

Goldschmidt und Rosell (B. 23, 487) untersuchten die Einwirkung von Benzaldehyd auf Ortho-Amidoazotoluol und auf Benzolazo- β -Naphthylamin, die so erhaltenen Körper hatten die Konstitutionsformel




Goldschmidt & Polzer (B. 24, 1000) untersuchten dann noch weiters die Einwirkung anderer Aldehyde auf die beiden angeführten Ortho-Amidoazokörper.


Die durch Erhitzen des Aldehyds und des Ortho-Amidoazokörpers erhaltenen Produkte, **Triazine** genannt, stellten aus Alkohol umkrystallisirt weisse Körper dar, welche mit Salzsäure auf 180° erhitzt, sich nicht spalteten, wodurch sie sich wesentlich von den Benzylidenverbindungen unterschieden, welche durch Einwirkung des Benzaldehyds auf Para-Amidoazokörper entstehen (Berju 17, 1400).

Von H. Nölting und Herzberg wurden Triazine hergestellt aus Benzaldehyd und Chrysoidin. Die Condensation geht bei Anwesenheit von Salzsäure von Statten, das erhaltene Amidotriazin gibt sulfonirt, Körper von ausgesprochenem Zucker- geschmack. Eine Reihe von substituirten Triazinen ist auch von Wegelin (Dissertation Basel) dargestellt worden.

Darstellung des Triazins.



Zu einer Lösung von 6.4 g des Chlorid des Körpers



und 2·4 g frisch destillirtes Benzaldehyd hinzugefügt und 2 bis 3 Tage lang auf dem Wasserbade mit aufgesetztem Rückflusskühler erwärmt. Die Flüssigkeit wird hernach filtrirt und dreimal mit Thierkohle ausgekocht. Die schwach gelbliche Lösung wurde mit Ammoniak in der Kälte versetzt, wobei das Triazin ausfällt. Dasselbe wurde fünf- bis sechsmal aus Methylalkohol umkrystallisirt und hierbei fast ebenso oft mit Thierkohle gekocht. Es wurde schliesslich in geringer Menge als reine, weisse, glänzende Nadeln erhalten. Schmelzpunkt 179° C.

Stickstoffbestimmung:


0·0749 g Substanz geben 10·6 cm³ N bei 15° und 743 mm Druck.

16·37% berechnet,

16·21% gefunden.

Kuppelung des Meta-Amidodimethyl-o-toluidin mit Diazobenzolsulfosäure.

7·4 g reines sulfanilsaures Natrium wurde in Wasser gelöst und eine Lösung von 2·4 g Natriumnitrit (96%) in 33 cm³ Wasser dazu gegossen und hierauf bei 0° bis 10° unter Benützung eines Rührwerkes langsam 8·7 g Salzsäure (36%) (2 Moleküle) mit etwa 20 cm³ Wasser verdünnt eintropfen gelassen. Nach etwa 3 Stunden wurden in die gebildete Diazobenzolsulfosäure 5 g Meta-Amidodimethyl-o-toluidin in 5 cm³ Salzsäure gelöst eingetragen, einige Zeit stehen gelassen und dann mit Natronlauge alkalisch gemacht. Das Natronsalz des gebildeten Azokörpers scheidet sich in dunkelrothen Nadeln aus. Durch zweimaliges Umkrystallisiren aus Wasser wurde es ganz rein erhalten. Der Körper entspricht der Formel




Stickstoffbestimmung:

0.0798 g Substanz geben 11 cm³ N bei 16° und 744 mm Druck.

15.75% gefunden,

15.73% berechnet.

Condensation.




zur Bildung des entsprechenden Triazins.

3.3 g Natronsalz des Azofarbstoffes wurden in 20 cm³ Salzsäure und 10 cm³ Methylalkohol gelöst und 1.2 g frisch destillirtes Benzaldehyd dazugegeben und auf dem Wasserbade 3 bis 4 Stunden bis zum Farbumschlag der rothen Lösung in gelbbraun im Kolben mit aufgesetztem Rückflusskühler condensirt. Die filtrirte Lösung wurde mit Thierkohle gekocht. Mit Natronlauge fiel ein brauner, fast theerichter Niederschlag, der in Methylalkohol und Salzsäure wieder gelöst und mit Thierkohle gekocht wurde. Der Körper schmeckte wider Erwarten nicht süß und es gelang nicht denselben durch Umkrystallisiren rein zu gewinnen. Die Ausbeute dieses sehr unrein erhaltenen Körpers war von vorneherein schon eine sehr schlechte, es wurde daher bei den nachherigen Condensationen direct das, durch Natronlauge gefällte, Natronsalz der Chrysoidinsulfosäure verwendet, und in die Reactionsmasse, ohne vorher dieses Natronsalz durch Absaugen zu isoliren, Chlorwasserstoffsäure eingeleitet. Methylalkohol dazu gegeben und die erwärmte Lösung vom Kochsalz abfiltrirt. Zur Lösung wurde dann die berechnete Menge reines Benzaldehyd zugefügt und 5 Tage lang zur möglichst vollständigen Condensation am Wasserbade erwärmt. Beim Erkalten der Lösung schied sich nur eine sehr geringe Menge einer braunen, fast theerartigen Substanz aus. Dieselbe wurde abfiltrirt und ein Theil der Lösung stark eingeeengt, wobei sich ebenfalls eine braune, theerartige Masse abschied, die für die


erwartete freie Triazinsulfosäure gehalten wurde; doch gelang es nicht, dieselbe zu reinigen. Ein anderer Theil der Lösung wurde, wie bei dem ersten Versuche mit Natronlauge alkalisch gemacht, es fiel ein brauner Niederschlag, der wesentlich reiner war, als der bei der ersten Condensation erhaltene. Derselbe wurde durch Absaugen isolirt, zeigte sich aber ebenfalls nicht als süß schmeckend. Er war in Aether löslich, wodurch die Meinung nahe lag, dass dieser Körper nicht das Natriumsalz der Triazinsulfosäure, sondern ein einfaches Triazin sei, und dass bei der Condensation die Sulfogruppe eliminirt worden sei. Eine angestellte, qualitative Prüfung auf Schwefel ergab auch das Nichtvorhandensein von Schwefel. Das erhaltene Produkt war sohin bloss ein stark verunreinigtes, einfaches Triazin.



Kocht man die Salze der Diazoverbindungen (am besten die schwefelsauren) mit Wasser, so wird die Diazogruppe durch Hydroxyl ersetzt, unter Bildung von Phenolen. In nachstehendem Falle ist diese Reaction zur Darstellung eines tertiären Amidophenols benützt.



Darstellung des Meta-Oxydimethyl-o-toluidins



aus dem entsprechenden Amin.

15 g Meta-Amidodimethyl-o-toluidin wurden in 70 cm³ Schwefelsäure und 50 cm³ Wasser gelöst und bei starker Eiskühlung bei 5° unter Benützung eines Rührwerkes 7.2 g Natriumnitrit (96%) in 100 cm³ H₂O gelöst, zutropfen gelassen, bis

Jodkaliumstärkepapier sich mit der Lösung betupft, bläut. Hierauf wurde etwa 2 Stunden stehen gelassen, dann noch 250 cm^3 Wasser hinzugefügt und auf dem Wasserbade $1\frac{1}{2}$ Stunde lang erhitzt. Die erkaltete Lösung wurde in Gegenwart von Eis bei niederer Temperatur (5 bis 10°) mit Soda alkalisch gemacht. Es schied sich ein schwarzbrauner Theer ab.

Um das Amidokressol in reinem Zustande zu erhalten, wurden noch mehrere andere Versuche gemacht, bei denen mit den Gewichtsmengen der verwendeten Schwefelsäure und des verwendeten Wassers variirt wurde, doch ohne bessere Resultate zu erzielen. Die verschiedenen, alkalisch gemachten Lösungen wurden mit Aether mehrmals extrahirt, von der theerigen Emulsion abfiltrirt, die ätherischen Auszüge miteinander vereinigt, der Aether getrocknet und abdestillirt. Die zurückbleibende, schwarzbraune Masse wurde nun der fractionirten Destillation im Vacuum unterworfen.

Das Meta-Oxydimethyl-o-toluidin ging bei der Temperatur von 141° bis 146° über, bei etwa 20 mm Druck, als ein gelbgefärbtes, dickflüssiges Oel, das alsbald in der Vorlage erstarrt und nach mehrtägigem Stehen anfang krystallisch zu werden. Durch zweimaliges Umkrystallisiren aus Ligroin wurde es als weisser Körper erhalten. Schmelzpunkt 56° .

Stickstoffbestimmung:

0.146 g Substanz geben 12.6 cm^3 N bei 742 mm Druck und 19° .

9.27% N berechnet,

9.68% N gefunden.

Kohlenstoff und Wasserstoffbestimmung:

0.132 g Substanz geben 0.106 g Wasser und 0.3475 g Kohlensäure, das sind 0.01177 g Wasserstoff und 0.09477 g Kohlenstoff.

8.609% H, 71.52% C. berechnet,

8.92% H, 71.8% C gefunden.


Nach einem Patent, Gesellschaft für chemische Industrie in Basel (Friedländer, Band 1887 bis 1890, Nr. 44792) entsteht durch Einwirkung von rauchender Schwefelsäure von 30% SO₃-Gehalt auf Dimethyl- und Diäthylanilin die entsprechende

Meta-Sulfosäure  SO₃ H. Diese Reaction wurde benützt zur Darstellung der

Dimethyl-o-toluidin-m-Sulfosäure.

In ein Gemisch von 113 g rauchender Schwefelsäure von 25% SO₃-Gehalt und 16 g rauchender Schwefelsäure von 65% SO₃-Gehalt, welches einer rauchenden Schwefelsäure von 30% SO₃-Gehalt entspricht, wurden unter Eiskühlung langsam unter Umschütteln 22 g Dimethyl-o-toluidin in 5 bis 6 Portionen eingetragen, wobei die Temperatur bis auf 70° stieg. Nachdem die ganze Masse sich miteinander gemischt hatte, wurde sie auf dem Wasserbade mehrere Stunden auf 55° bis 60° erwärmt, bis eine in Wasser eingegossene Probe mit Alkali versetzt, sich klar löste. Die Lösung wurde in Wasser eingegossen und mit Kalkmilch alkalisch gemacht, vom schwefelsauren Kalk abfiltrirt und zur Fällung des überschüssigen Calciumhydroxydes Kohlensäure eingeleitet und nachher filtrirt.

Die Lösung des Calciumsalzes der Sulfosäure wurde mit Natriumcarbonat bis zur schwach alkalischen Reaction versetzt, filtrirt, und das Natriumsalz der Sulfosäure durch Eindampfen der Lösung gewonnen; dasselbe ist in Wasser leicht löslich. Analysirt wurde das Baryumsalz der Sulfosäure, dasselbe wurde hergestellt, indem nach beendeter Sulfonirung die Masse in Wasser eingegossen und mit Baryhydrat alkalisch gemacht wurde. In dem Filtrat wurde durch Einleiten von Kohlensäure das überschüssige Baryhydrat gefällt, filtrirt, und das Baryumsalz der Sulfosäure durch Eindampfen erhalten.



Stickstoffbestimmung:

0.2655 g Substanz geben 24 cm³ N bei 14° und 736 mm Druck.

9.91% N berechnet,

10.29% gefunden.

Baryumbestimmung:

0.1012 g Substanz geben 0.0412 g Ba SO₄, d. s. 0.02422 g Baryum.

24.24% Ba berechnet,

23.93 % Ba gefunden.



Das einfache Meta-Diamin lässt sich, wie Griess zeigte, sowohl mit 1, als auch mit 2 Molekülen Diazoverbindung kuppeln. Bei letzterer Kuppelung geht die Diazogruppe zweimal je in die Ortho-Para-Stellung zu den Amidgruppen. Es lag nun nahe zu versuchen, ob auch das Meta-Toluylendiamin



sich mit 2 Molekülen einer Diazoverbindung copulieren lässt. Bildet sich eine Tetrazoverbindung, so geht die erste Diazogruppe in die Ortho-Para-Stellung, für die zweite Diazogruppe ist dann nur die doppelte Ortho-Stellung möglich.

Zum Studium der Reaction wurde zunächst Meta-Phenylendiamin mit 2 Molekülen Diazobenzolchlorid copuliert, dargestellt, dass fertiges Chrysoidin noch mit einem weiteren Molekül Diazobenzolchlorid behandelt wurde. Der so erhaltene Farbstoff färbte wesentlich gelbbrauner als das einfache Chrysoidin.

Meta-Toluylendiamin wurde auf nachstehende Weise mit 1 und 2 Molekülen Diazobenzolchlorid behandelt.

Kuppelung mit 2 Molekülen Diazobenzolchlorid.

9·3 g frisch destillirtes Anilin wurden in 30 cm³ Salzsäure und 70 cm³ Wasser gelöst und mit 7·2 g Natriumnitrit (96⁰/₁₀) in der Kälte diazotirt, kalt noch einige Zeit stehen gelassen und 6 g Toluylendiamin in 20 cm³ Salzsäure und 70 cm³ Wasser dazu gegeben und nachher langsam in der Kälte Soda eingetragen, bis zur ganz schwach sauren Reaction. Nach mehrstündigem Stehen endlich ganz alkalisch gemacht und mittelst der Thonbirne abgesaugt.

Kuppelung mit 1 Molekül Diazobenzolchlorid.

4·65 g Anilin wurden gelöst in 2 Molekülen Salzsäure und mit 3·6 g Natriumnitrit (96⁰/₁₀) in 50 cm³ Wasser, diazotirt und diese Lösung auf 8·4 g Toluylendiamin einwirken gelassen, langsam neutralisirt und schliesslich alkalisch gemacht. Die beiden Farbstoffe zeigten sich, was ihre Löslichkeit anbetraf und des weiteren auch in ihren färbenden Eigenschaften sehr ähnlich (sie wurden in schwach essigsauerm Bade auf tannirte Baumwolle ausgefärbt). Die Produkte eigneten sich wenig zur Reindarstellung und nach den Ausfärbungen zu urtheilen, machte es den Anschein, als ob sich keine Tetrazoverbindung gebildet hätte, sondern dass nur ein stark verunreinigtes Chrysoidin vorliege. Zur Reindarstellung von Chrysoidinfarbstoffen und Tetrazofarbstoffen schien sich das diazotirte Para-Nitranilin besser zu eignen. Dasselbe wurde im Verhältniss von je einem Molekül auf 1 Molekül Base und je 2 Molekülen auf 1 Molekül Base, auf das Meta-Amidodimethyl-o-toluidin einwirken gelassen und wie folgt gearbeitet.

Das Diazotiren des Para-Nitranilins.

Das Para-Nitranilin wurde mit der berechneten Menge Natriumnitrit versetzt und in Wasser aufgeschlemmt und hernach rasch 5 Molekülen Salzsäure hineingegossen. Bei Bildung grösserer Mengen von Diazoamidoverbindung wurde der Versuch wiederholt, bei Bildung geringerer Mengen nur von denselben abfiltrirt.

Kuppelung des Toluylendiamins.

Kuppelung mit 2 Molekülen Para-Nitranilins.

9·135 Toluylendiamin wurden in 11 *g* Salzsäure und 100 *cm*³ Wasser gelöst, und darauf 20·7 *g* diazotirtes Para-Nitranilin einwirken gelassen. Natriumacetat im Ueberschusse hinzugefügt und durch 24 Stunden stehen gelassen.

Kuppelung mit 1 Molekül Para-Nitranilin.

Zu 6·089 *g* Toluylendiamin, welche in 7 *g* Salzsäure und 100 *cm*³ Wasser gelöst waren, wurden 6·9 *g* diazotirtes Para-Nitranilin hinzugefügt und wie oben weiter behandelt. Der erste der beiden beschriebenen Farbstoffe fiel bedeutend dunkler aus als der letztere, doch war nach dem Abfiltriren und Trocknen kein Unterschied mehr zu bemerken.

Kuppelung des Meta-Amidodimethyl-o-toluidins.

Kuppelung mit 1 Molekül Para-Nitranilin.

Zur Lösung von 5 *g* Amidodimethyl-o-toluidin in verdünnter Salzsäure wurden 4·6 *g* diazotirtes Para-Nitranilin hinzu gegeben und wie früher weiter behandelt.

Kuppelung mit 2 Molekülen Para-Nitranilin.

Auf die Lösung von 5 *g* Meta-Amidodimethyl-o-toluidin in verdünnter Salzsäure wurden 9·2 *g* diazotirtes Para-Nitranilin einwirken gelassen und wie früher gearbeitet. Der sich hierbei bildende Farbstoff fiel bedeutend dunkler aus als der vorher beschriebene, doch war nach dem Abfiltriren und Trocknen kein Unterschied mehr zu bemerken.


Die aus dem Meta-Toluylendiamin erhaltenen Farbstoffe waren in den gewöhnlichen Lösungsmitteln nur sehr wenig löslich, am leichtesten noch in Alkohol, gut löslich aber nur in heissem Nitrobenzol, aus welchem sie unkrystallisirt und hernach gut mit Aethergewaschen wurden. Analysenrein konnten sie nicht erhalten werden; die vorgenommenen Stickstoffbestimmungen ergaben

wenigstens zu niedere Resultate. Obgleich der, durch Kuppelung mit 2 Molekülen Para-Nitranilin gewonnene Farbstoff sich schwerer löslich zeigte, glaube ich doch, dass sich bloss eine Diazoamidoverbindung bildete, aber kein Tetrazofarbstoff. Die Diazoamidoverbindung zersetzt sich beim Trocknen und das Chrysoidin ist dann bedeutend unreiner, und dadurch auch schwerer löslich, als das Chrysoidin (gewonnen durch Kuppelung von 1 Molekül Diazoverbindung mit 1 Molekül Amin). Diese Meinung fand durch die vorgenommenen Ausfärbungen ihre Bestätigung. Beide Produkte wurden in schwachsaurer Lösung auf tannirte Baumwolle ausgefärbt. Der durch Kuppelung mit 2 Moleküle Diazoverbindung hergestellte Farbstoff färbte heller und stumpfer, aber mit gleicher Nuance, wie der einfache Azofarbstoff.

Mit den beiden aus Meta-Amidodimethyl-o-toluidin hergestellten Produkten, welche in Alkohol ziemlich gut löslich waren und daraus umkrystallisirt wurden, ergaben die Lösungs- und Ausfärbungsversuche ein ähnliches Resultat wie oben.

Der durch Kuppelung mit 2 Molekülen Diazoverbindung erhaltene Körper konnte nicht analysenrein bekommen werden. Die damit vorgenommenen Stickstoffbestimmungen ergaben zu niedere Resultate.

Das durch Kuppelung mit 1 Molekül Diazoverbindung hergestellte Produkt von der Formel



Stickstoffbestimmung:

0.0397 g Substanz geben 8.3 cm³ N bei 746 mm Druck bei 18°.

23.41% N berechnet,

23.69% N gefunden.

Zusammenfassung.

Neue analysirte Produkte.

Meta-Nitrodimethyl-o-toluidin,
Meta-Amidodimethyl-o-toluidin,
Benzoylverbindung des Meta-Amidodimethyl-o-toluidins,
Para-Toluolsulfoderivat des Meta-Amidodimethyl-o-toluidins,
Meta-Amidodimethyl-o-toluidin-azobenzol,
Meta-Amidodimethyl-o-toluidin-azobenzolsulfosäure,
Meta-Amidodimethyl-o-toluidin-azonitrobenzol,
Triazin des Meta-Amidodimethyl-o-toluidin,
Nitrosoverbindung des Benzoylderivates,
Chlorhydrat der Nitrosoverbindung des Para-Toluolsulfoderivates,
Dimethyl-o-toluidinsulfosäure,
Meta-Oxydimethyl-o-toluidin.

Neue nicht analysirte Produkte.

Condensationsprodukt aus:
Nitrosodimethylanilin mit dem Benzoylderivat,
Nitrosodimethylanilin mit dem Para-Toluolsulfoderivat,
Dimethyl-m-amidophenol mit dem Chlorhydrat des Nitroso-p-Toluolsulfoderivates.

Resultatlose Versuche.

Condensation der Meta-Amidodimethyl-o-toluidinazobenzolsulfosäure mit Benzaldehyd,
Kuppelung von Diazobenzolchlorid (2 Moleküle) mit (1 Molekül) Toluylendiamin,
Kuppelung von Para-Nitrodiazobenzolchlorid (2 Moleküle) mit (1 Molekül) Toluylendiamin,
Kuppelung von Para-Nitrodiazobenzolchlorid (2 Moleküle) mit (1 Molekül) Meta-Amidodimethyl-o-toluidin.

K. u. k. Hofbuchdruckerei Carl Fromme in Wien.